

Drinks for babies and young children: Arabic



# المشروبات للرضع والأطفال الصغار




## حليب الثدي هو أفضل مشروب لرضيعك

الأطفال الذين يرضعون طبيعياً لا يحتاجون إلى أي مشروبات أخرى في أول 6 شهور. حليب الثدي أو الحليب الصناعي للرضع يجب أن يكون المشروب الأساسي أثناء العام الأول من أعمارهم.

استمرّي في استخدام حليب الثدي أو الحليب الصناعي للرضع كمشروب أساسي عندما تفطمين رضيعك. إذا احتاج الرُّضع إلى مشروب بجانب الحليب، فيجب إعطاؤهم ماء صنبور مغلياً (حتى عمر 6 أشهر).

الزمي العناية الفائقة عند إعداد الحليب الصناعي للأطفال واتبعي إرشادات الشركة المصنعة. النصيحة الحالية من وكالة المعايير الغذائية هي إعداد زجاجة واحدة من الحليب الصناعي السريع للأطفال في المرة الواحدة. بوسع زائرتك الصحية إسداء النصح في هذا الشأن.

يمكنك أيضًا استخدام المياه المعبأة، ولكن حصرًا إذا احتوت على الصوديوم (يُكتب أحياناً باسم Na) بمقدار أقل من 200 مجم لكل لتر. يلزم أيضًا غلي المياه المعبأة قبل تحضير الرضعة.



الحليب الصناعي القائم على الصويا يحتوي على سكريات، ما قد يسبب تسوس الأسنان. الحليب الصناعي القائم على الصويا مناسب من عمر 6 شهور حصرًا ويجب ألا يُعطى إلا بمشورة من طبيب(ت) لك أو زائرتك الصحية. ولا توجد أي ميزة لحليب المتابعة على حليب الرضاعة للمرحلة الأولى وليس ضروريًا.

### اختيار مشروبات خالية من السكر لرضيعك سوف:

يُكسبه عادات صحية مدى الحياة  
يساعد في الوقاية من التسوس في  
الأسنان الأولى

يُحسن صحة رضيعك وتفذি�ته في العموم  
يحافظ على المظهر الجميل لابتسامة رضيعك.



## أكواب الشرب الحر: خطوة للأمام لرضيعك

- الأكواب المانعة للنسكاف (ذات الصمام) تشجع رضيعك على الشفط بدلاً من الرشف ويلزم تجنبيها. حركة الشفط يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في النطق بطريقة غير مباشرة.
- المشروبات المأخوذة من زجاجة يُرجح أكثر أن تؤدي إلى مشكلات الأسنان لأن السائل يميل إلى البقاء في الفم أطول من بقائه لو تم رشنه من كوب.
- استهدفني ألا يشرب رضيعك إلا من كوب (وألا يستخدم الزجاجات بعد ذلك) بحلول عيد ميلاده الأول.





- تجنبِ تماماً إعطاء المشروبات السكرية في زجاجات أو أكواب ذات صمامات لأن هذا قد يسبب تسوساً للأسنان سريعاً جداً.
- تجنبِ تماماً إعطاء رضيعك مشروبات سكرية كآخر شيء من الليل أو أثناء الليل إذا استيقظ. الأوقات الخطيرة الأخرى لتقديم المشروبات السكرية فيها هي بين الوجبات، وفي عربة الأطفال أو مقعد السيارة، أو كطريقة لتهيئة الرضيع.
- تجنبِ تماماً ترك رضيعك بمفرده مع كوب أو زجاجة، سواء أثناء النهار أو حينما يكون في السرير، فقد يعرضه للاختناق.

**الماء هو أفضل مشروب بين الوجبات للرضيع والأطفال الدارجين العطشانيين.**

## نصيحة بشأن المشروبات الأخرى



### الماء

بعد عمر 6 أشهر، الماء هو أفضل مشروب لإرواء العطش بين الوجبات. استخدمي ماء الصنبور (بدلاً من المعبأ). لا تقدمي إلا ماء الصنبور المغلي بعد تبریده للأطفال الأصغر من 6 أشهر عند الحاجة. اطلبِي النصيحة من زائرتك الصحية.



### الحليب البقرى

بدءاً من عمر 12 شهراً، يمكنك بدء تقديم حليب بقرى كامل الدسم أو حليب بقرى مبستر نصف منزوع الدسم بصفته مشروباً أساسياً. يحتوي الحليب على الكالسيوم، وهو ضروري لعظام قوية. وينبغي عدم تقديم الحليب البقرى المبستر منزوع الدسم واللذي يحتوي على دسم بنسبة 1% بصفته مشروباً أساسياً حتى سن الخامسة.



### عصير الفواكه الطازجة المخفف (جزء واحد من العصير مقابل جزء واحد من الماء، أو ماء أكثر حسب الضرورة)

يمكن تقديم هذا من عمر 6 أشهر، في أوقات الوجبات فقط. عصير الفواكه الطازجة المخفف مصدر جيد لفيتامين ج ويُفضل تقديمها مع الإفطار أو مع وجبة رئيسية للمساعدة في امتصاص الحديد. تجنبي تماماً تقديم هذا المشروب بين الوجبات لأن عصير الفواكه الطازجة حمضية ويمكن أن تسبب تآكل أسنان رضيعك. تذكري - تجنبي تماماً تقديم العصير في زجاجة رضاعة.

## **المشروبات غير المستحسنة**

### **X مشروبات الأطفال الرّضع**

أغلبها (حتى تلك التي تحمل كلمة "عضوٍ" أو "صحيٍ") يحتوي على السكر، ما قد يسبب تسوس الأسنان.

### **X المياه المُنكَّهة**

أغلب المياه المُنكَّهة تحتوي على مُحليلات اصطناعية ولهذا يجب ألا تقدم للرّضع أو الأطفال الدارجين. الكثير من هذه المشروبات يحتوي أيضًا على السكر الذي قد يسبب تسوس الأسنان. هذه المشروبات أيضًا عضوية ويمكنها أن تسبب تآكل أسنان رضيعك.

### **X الحليب المُنكَّه، ومخفوقات الحليب والعصائر القائمة على الحليب**

تحتوي هذه على السكريات وقد تسبب تسوس الأسنان. تجنبِي هذه المشروبات تماماً بين الوجبات أو كآخر شيء ليلاً.

**الحليب العادي وماء  
الصنوبر هما آمن  
المشروبات للأسنان.**



### **X العصير والمشروبات الغازية المخففة**

هذه تحتوي على السكريات والمُحليلات اصطناعية. لا يستحسن أن تقدمي هذه المشروبات للرّضع أو الأطفال الدارجين. وإذا قدمت عصيراً مخففاً، فتذكري أن تقدميه مخففاً بشدة وفي أوقات الوجبات فقط.

### **X الشاي، وشاي الأعشاب والقهوة (حتى غير المُحللة)**

هذه مشروبات غير مناسبة للرّضع أو الأطفال الصغار. تؤثر هذه المشروبات في طريقة امتصاص طفلك للحديد من طعامه.

# اقرئي الملصقات - ابحثي عن السكريات!

تحقق من الملصق وانتهي للسكريات المخفية. السكريات الأساسية الواجب البحث عنها هي: **الغلوکوز، وشراب الغلوکوز، والفرکتوز، وعصير فواكه مرکز، والسکروز، والدکستروز، والعسل، والسكر المحول، والمالتوز، والنشا المتحل.** إذا رأيت هذه العناصر على الملصق، فحاولي تجنب هذه المشروبات لأنها قد تسبب تسوس الأسنان.

الكثير من المنتجات الغذائية الحاملة لملصق "صحي"، أو "منخفض السكريات"، أو "بدون إضافة سكر" أو "عشبي" ربما تظل تحتوي على السكر.

لمعلومات إضافية، اسأل زائرتك الصحية أو تفضل بزيارة [www.child-smile.org.uk](http://www.child-smile.org.uk)

Public Health Scotland هي هيئة عامة وطنية اسكتلندية تهدف إلى تحسين صحة الشعب الاسكتلندي ورفاهيته وزيادة عافيته.

© Public Health Scotland 2025




تم ترخيص إعادة استخدام هذا الدليل بموجب الإصدار الثالث من الترخيص الحكومي المفتوح (Open Government Licence v3.0).  
لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة [www.publichealthscotland.scot/ogl](http://www.publichealthscotland.scot/ogl)

[www.publichealthscotland.scot](http://www.publichealthscotland.scot)

المكونات  
ماء غلوکوز، شراب الفركتوز (من القمح والذرة، وعصير كشمش أسود من عصير مرکز (6%).  
سكر، فيتامين ج، حمض السترات.

## بيانات التغذية

القيمة المعتادة	لكل 100 جم
الطاقة	219 كيلو جول/51 سعر حراري
كمية ضئيلة	بروتين
12.6 جم	كريوهيدرات
<b>12.1 جم</b>	<b>السكريات منه</b>
صفر	دهون
صفر	المشبعة منها
صفر	الياف
كمية ضئيلة	صوديوم
فيتامين ج 24 مجم (40% من المقررات الغذائية اليومية).	فيتامين ج 288 مل تتوفر 115% من المقررات الغذائية اليومية من فيتامين ج.



الترجمات والتنسيق الأخرى متوفرة عند الطلب على:

[@  
0131 314 5300](mailto:phs.otherformats@phs.scot)